

Коротка характеристика препарату

1. Назва

Адвантейдж®

2. Склад

100 мл препарату містять:

діючу речовину імідаклоприд – 10,0 г.

Допоміжні речовини: бензиловий спирт, пропілену карбонат, антиоксидант бутилгідрокситолуен.

3. Фармацевтична форма

Краплі.

4. Фармакологічні властивості

АТС vet: QP53, ектопаразитициди, інсектициди і репеленти (QP53AX17, імідаклоприд)

Діюча речовина препарату *Імідаклоприд*, 1-(6-*Chloro-3-pyridylmethyl*)-*N-nitro-imidazolidin-2-ylideneamine* – ектопаразитицид, що належить до групи хлорнікотинілових сполук. Має високу спорідненість до нікотинергічних ацетилхолінових рецепторів у постсинаптичних ділянках центральної нервової системи бліх. Він приєднується до нікотинергічного рецептора блохи, розміщеного на постсинаптичному нейроні, перериває передачу нервового імпульсу, що в подальшому призводить до загибелі паразита.

Слабка взаємодія імідаклоприду з нікотинними рецепторами ссавців зумовлює низький рівень проникнення через гематоенцефалічний бар'єр, тому імідаклоприд практично не впливає на ЦНС тварин. Імідаклоприд ефективний проти личинок бліх та зрілих особин.

Після місцевого застосування препарату імідаклоприд швидко розповсюджуються по всій шкірі тварини впродовж однієї доби після нанесення. Клінічно доведено, що системна абсорбція препарату дуже низька.

5. Клінічні особливості

5.1 Вид тварин

Коти, декоративні кролі.

5.2 Показання до застосування

Профілактика та лікування котів і декоративних кролів при ураженні блохами *Stenoccephalides felis*. Препарат може бути застосований для лікування алергічного блошиного дерматиту. Одна обробка захищає тварину від повторної інвазії протягом 4-х тижнів.

5.3 Протипоказання

Не застосовувати кошенятам віком до 8-ми тижнів.

Не застосовувати декоративним кролям віком до 10-ти тижнів.

Не застосовувати кролям, м'ясо яких призначається для вживання в їжу людям.

Не застосовувати тваринам з відомою гіперчутливістю до складових препарату.

5.4 Побічна дія

Препарат гіркий на смак і може викликати саливацію у тварин при злизуванні препарату після нанесення на шкіру, але це не є ознакою інтоксикації. Ознаки гіперсаливації зникають через декілька хвилин.

У дуже рідких випадках після нанесення препарату можуть виникнути такі шкірні реакції як втрата шерсті, почервоніння, свербіж та ураження шкіри. Може виникнути слинотеча та інші розлади нервової системи, такі як порушення координації, тремор і депресії, які були зареєстровані виключно у котів.

5.5 Особливі застереження при використанні

Обробку тварин препаратом треба проводити таким чином, щоб препарат не попадав тварині в очі та ротову порожнину.

Після обробки тварин препаратом не допускати контакту тварин один з одним до повного висихання шкіри.

5.6 Використання під час вагітності, лактації, несучості

Застережень немає.

5.7 Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

При дворазовому підвищенні рекомендованої дози препарату та одночасному застосуванні таких ветеринарних препаратів, як луфенорон, пірантел, празіквантел несумісності не спостерігалось. Також доведена сумісність препарату при одночасному використанні багатьох ветеринарних препаратів, у тому числі і вакцин.

5.8 Дози і способи введення тваринам різного віку


Для тварин масою тіла до 4 кг застосовують 1 піпетку Адвантейдж®40 (0,4 мл), більше 4 кг - Адвантейдж®80 (0,8 мл).

Повторна інвазія блохами із зовнішнього середовища можлива через 6 тижнів і більше після обробки. Додатково рекомендується обробляти місця перебування тварин (підстилки, коврики) для знищення дорослих та личинкових стадій бліх.


Препарат не втрачає ефективності при намоканні шерсті тварини, але у таких випадках можлива додаткова обробка – залежно від наявності бліх у навколишньому середовищі. У таких випадках не рекомендується обробляти тварину частіше, ніж 1 раз на тиждень.

Спосіб застосування:

Вийміть піпетку з упаковки, тримайте у вертикальному положенні. Зніміть ковпачок, переверніть його та одягніть на піпетку, таким чином видаливши фольгу.



Розділіть шерсть на шії тварини біля основи черепа так, щоб було видно шкіру. Розмістіть вузький кінець піпетки на шкіру, міцно стисніть піпетку декілька разів, щоб нанести весь вміст безпосередньо на шкіру.



Використовувати тільки на непошкоджену шкіру. Не допускати щойно оброблених тварин вилизувати одне одного !

5.9 Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)

При 5-кратному перевищенні рекомендованої дози препарату для котів та 4-кратному перевищенні для кролів впродовж 4-х тижнів поспіль у тварин не спостерігалось клінічних ознак передозування.

5.10 Спеціальні застереження

Немає.

5.11 Період виведення (каренція)

Для непродуктивних тварин не регламентується.

5.12 Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

Під час роботи з препаратом не дозволяється палити, пити і приймати їжу. Після закінчення роботи необхідно вимити руки теплою водою з милом. При випадковому попаданні препарату на шкіру або слизові оболонки його необхідно відразу промити проточною водою. Якщо після попадання препарату на шкіру або в очі подразнення після промивання водою не зникає, необхідно звернутися за медичною допомогою. Не можна гладити тварину і допускати її до маленьких дітей протягом 48 годин після обробки препаратом.

6. Фармацевтичні особливості

6.1 Форми несумісності (основні)

Невідомі.

6.2 Термін придатності

5 років.

6.3 Особливі заходи зберігання

Препарат зберігають у сухому темному, добре вентильованому, приміщенні на стелажах при температурі від 5 до 25 °С.

Зберігати окремо від продуктів харчування та кормів.

6.4 Природа і склад контейнера первинного пакування

Пропіленові піпетки 0,4 мл (Адвантейдж®40) та 0,8 мл (Адвантейдж®80).

6.5 Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним препаратом або із його залишками

Невикористаний препарат та тара повинні бути знешкоджені у відповідності з національними вимогами.

7. Назва і місце знаходження власника реєстраційного посвідчення

Байер Енімал Хелс ГмбХ
D-51368, Леверкузен, Німеччина

Bayer Animal Health GmbH (Germany)
D-51368, Leverkusen

8. Назва і місце знаходження виробника

КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ
Проєнсдорфер стр. 324, D-24106 Кіль,
Німеччина

KVP Pharma+Veterinar Produkte GmbH
(Germany) Projensdorfe Str. 324, D-24106 Kiel

9. Додаткова інформація

Адвантейдж®
(Краплі)
листівка-вкладка

Опис

Прозорий розчин від жовтого до світло-коричневого кольору.

Склад

100 мл препарату містять:

діючу речовину імідаклоприд – 10,0 г.

Допоміжні речовини: бензиловий спирт, пропілену карбонат, антиоксидант бутилгідрокситолуен.

Фармакологічні властивості

АТС vet: QP53, ектопаразитициди, інсектициди і репеленти (QP53AX17, імідаклоприд)

Діюча речовина препарату **Імідаклоприд**, 1-(6-Chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitro-imidazolidin-2-ylideneamine – ектопаразитицид, що належить до групи хлорнікотинілових сполук. Має високу спорідненість до нікотинергічних ацетилхолінових рецепторів у постсинаптичних ділянках центральної нервової системи бліх. Він приєднується до нікотинергічного рецептора блохи, розміщеного на постсинаптичному нейроні, перериває передачу нервового імпульсу, що в подальшому призводить до загибелі паразита.

Слабка взаємодія імідаклоприду з нікотиновими рецепторами ссавців зумовлює низький рівень проникнення через гематоенцефалічний бар'єр, тому імідаклоприд практично не впливає на ЦНС тварин. Імідаклоприд ефективний проти личинок бліх та зрілих особин.

Після місцевого застосування препарату імідаклоприд швидко розповсюджуються по всій шкірі тварини впродовж однієї доби після нанесення. Клінічно доведено, що системна абсорбція препарату дуже низька.

Застосування

Профілактика та лікування котів і декоративних кролів при ураженні блохами *Stenoccephalides felis*. Препарат може бути застосований для лікування алергічного блошиного дерматиту. Одна обробка захищає тварину від повторної інвазії протягом 4-х тижнів.

Дозування


Для тварин масою тіла до 4 кг застосовують 1 піпетку Адвантейдж®40 (0,4 мл), більше 4 кг - Адвантейдж®80 (0,8 мл).

Повторна інвазія блохами із зовнішнього середовища можлива через 6 тижнів і більше після обробки. Додатково рекомендується обробляти місця перебування тварин (підстилки, коврики) для знищення дорослих та личинкових стадій бліх.


Препарат не втрачає ефективності при намоканні шерсті тварини, але у таких випадках можлива додаткова обробка – залежно від наявності бліх у навколишньому середовищі. У таких випадках не рекомендується обробляти тварину частіше, ніж 1 раз на тиждень.

Спосіб застосування:

Вийміть піпетку з упаковки, тримайте у вертикальному положенні. Зніміть ковпачок, перевірте його та одягніть на піпетку, таким чином видаливши фольгу.



Розділіть шерсть на шиї тварини біля основи черепа так, щоб було видно шкіру. Розмістіть вузький кінець піпетки на шкіру, міцно стисніть піпетку декілька разів, щоб нанести весь вміст безпосередньо на шкіру.



Використовувати тільки на непошкоджену шкіру. Не допускати щойно оброблених тварин вилизувати одне одного !

Протипоказання

Не застосовувати кошенятам віком до 8-ми тижнів.

Не застосовувати декоративним кролям віком до 10-ти тижнів.

Не застосовувати кролям, м'ясо яких призначається для вживання в їжу людям.

Не застосовувати тваринам з відомою гіперчутливістю до складових препарату.

Застереження

Під час роботи з препаратом не дозволяється палити, пити і приймати їжу.

Обробку тварин рекомендується проводити у захисних рукавицях.

Після закінчення роботи необхідно вимити руки теплою водою з милом.

При випадковому попаданні препарату на шкіру або слизові оболонки його необхідно відразу промити проточною водою. Якщо після попадання препарату на шкіру або в очі подразнення після промивання водою не зникає, необхідно звернутися за медичною допомогою.

Не можна гладити тварину і допускати її до маленьких дітей протягом 48 годин після обробки препаратом.

Форма випуску

Пропіленові піпетки 0, 4 мл (Адвантейдж ® 40) та 0,8 мл (Адвантейдж ® 80).

Зберігання

Препарат зберігають у сухому темному, добре вентильованому, приміщенні на стелажах при температурі від 5 до 25 °С.

Зберігати окремо від продуктів харчування та кормів.

Термін придатності

5 років.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

Байер Енімал Хелс ГмБХ
D-51368, Леверкузен, Німеччина

Bayer Animal Health GmbH (Germany)
D-51368, Leverkusen

Виробник готового продукту

КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмБХ
Проенсдорфер стр. 324, D-24106 Кіль,
Німеччина

KVP Pharma+Veterinar Produkte GmbH
(Germany) Projensdorfe Str. 324, D-24106 Kiel

813569539

advantage

Для великих котів та декоративних кролів

advantage®

4 0,03 л

> 4 kg

4 0,03 л

advantage

Для великих котів та декоративних кролів

Авантейдж®
Препарат для профілактики та лікування інвазій бліх у котів та декоративних кролів масою тіла понад 4 кг

Авантейдж®
Препарат для профілактики і лічення інвазій бліх у котів та декоративних кролів масою тіла більше 4 кг

Спотон розчин для зовнішнього застосування
Діюча речовина: імідаклоприд 100 мг/мл
Спотон р-р для зовнішнього застосування
Діючі речовини: імідаклоприд 100 мг/мл

advantage

advantage

advantage

advantage

advantage

advantage

Авантейдж®
Кролі спотон для котів та декоративних кролів масою тіла більше 4 кг
Експозитивний зовнішній заспокійник.

Застосування:
Для профілактики та лікування інвазій бліх депаративних кролів, а також для лікування алергічного болюного дерматиту. Обробка захищає тварину від повторної інвазії протягом 4 тижнів.

Дозування:
Для тварин масою тіла до 4 кг застосовувати Авантейдж® 40 (0,4 мл), більше 4 кг Авантейдж® 80 (0,8 мл).

Специфічне застосування:
Розділіть шість на шість тварин бліх основні черв'яки, щоб було видно шкуру. Розмістіть вузький кінець пилетки на шкуру, міцно стисніть пилетку дельтовидно, щоб весь вміст нанести безпосередньо на шкуру. Нанести препарат тільки на непокритому шкуру. Не допускати щільно оброблених тварин виходити одразу.

Протипоказання:
Не використовувати для кошат віком до 10-ти тижнів. Не застосовувати кролькам віком до 10-ти тижнів. Не застосовувати кролькам, які проляжені для виведення в яку годять.

Зберігання:
Окремо від продуктів харчування та кормів при температурі від 5 до 25°C.

Термін придатності: 5 років.

Власник реєстраційного посвідчення:
Байер Ензімал Мелс ГмБХ, Лейпциг, Німеччина

Виробник готового продукту:
KVT Фарма і Ветеринар-Продукт ГмБХ, Німеччина

РП: вд

Авантейдж®
Кролі спотон для котів та декоративних кролів масою тіла більше 4 кг
Експозитивний зовнішній заспокійник.

Застосування:
Для профілактики та лічення інвазій бліх депаративних кролів, а також для лікування алергічного болюного дерматиту. Обробка захищає тварину від повторної інвазії протягом 4 тижнів.

Дозування:
Для тварин масою тіла до 4 кг застосовувати Авантейдж® 40 (0,4 мл), більше 4 кг Авантейдж® 80 (0,8 мл).

Специфічне застосування:
Розділіть шість на шість тварин бліх основні черв'яки, щоб було видно шкуру. Розмістіть вузький кінець пилетки на шкуру, міцно стисніть пилетку дельтовидно, щоб весь вміст нанести безпосередньо на шкуру. Нанести препарат тільки на непокритому шкуру. Не допускати щільно оброблених тварин виходити одразу.

Протипоказання:
Не використовувати для кошат віком до 10-ти тижнів. Не застосовувати кролькам віком до 10-ти тижнів. Не застосовувати кролькам, які проляжені для виведення в яку годять.

Зберігання:
Окремо від продуктів харчування та кормів при температурі від 5 до 25°C.

Термін придатності: 5 років.

Власник реєстраційного посвідчення:
Байер Ензімал Мелс ГмБХ, Лейпциг, Німеччина

Виробник готового продукту:
KVT Фарма і Ветеринар-Продукт ГмБХ, Німеччина

РП: вд

Номер партії/Номер партії:
Дата виготовлення/Дата виготовлення:
Термін придатності/Срок годності:

Bayer

0,8 мл

advantage[®]

Адвантейдж[®]

Для маленьких котів та декоративних
кролів вагою 4 кг і більше

Для маленьких котів и декоративних
кролей весом 4 кг и больше

Серія №/Серия №: Придатний до/Годен до:

0,4 мл

advantage[®]

Адвантейдж[®]

Для маленьких котів та декоративних
кролів вагою до 4 кг

Для маленьких котів и декоративных
кролей весом до 4 кг

Серія №/Серия №: Придатний до/Годен до:

advantage®

Адвантейдж®

Для маленьких котів та декоративних кролів вагою 4 кг і більше
Для зовнішнього застосування. Тільки для тварин.
Кожна піпетка 0,8 мл містить 80 мг імідаклоприду.
Термін придатності: див на упаковці.

Для маленьких котів и декоративных кролей весом 4 кг и больше
Для наружного применения. Только для животных.
Каждая пипетка 0,8 мл содержит 80 мг имидаклоприда.
Срок годности: см. на упаковке.

4 x 0,8 мл піпетки
пипетки



advantage®

Адвантейдж®

Для маленьких котів та декоративних кролів вагою до 4 кг
Для зовнішнього застосування. Тільки для тварин.
Кожна піпетка 0,4 мл містить 40 мг імідаклоприду.
Термін придатності: див на упаковці.

Для маленьких котів и декоративных кролей весом до 4 кг
Для наружного применения. Только для животных.
Каждая пипетка 0,4 мл содержит 40 мг имидаклоприда.
Срок годности: см. на упаковке.

4 x 0,4 мл піпетки
пипетки

